

Instructieblad

Midazolam multi-dose neusspray



1 Verwijder de beschermdop.



2 Houd de neusspray vast met de duim onder het flesje en de wijs- en middelvinger aan weerskanten van de tuit.



3 Heeft u een nieuwe neusspray? Of heeft u de neusspray langer dan 1 week niet gebruikt?

Spuit dan eerst in de lucht tot u een mooi gelijkmatige verstuiving ziet.



4 Til het hoofd van een liggende patiënt iets op.



5 Plaats de tuit van de neusspray in een neusgat en druk de neusspray helemaal in.



6 Moet u nog een verstuiving toedienen?

Plaats de tuit van de neusspray dan in het andere neusgat en druk de neusspray opnieuw helemaal in.



7 Leg na toediening het hoofd weer voorzichtig neer en leg de persoon zo mogelijk in de zijligging.



8 Stopt de epileptische aanval niet binnen 5 minuten?

Bel dan 112 (tenzij daarover iets anders is afgesproken met de arts).



Bent u klaar?

Spoel dan de tuit van de neusspray goed schoon met water en plaats de beschermdop terug.



Controleer of er nog voldoende vloeistof in het flesje zit voor een volgende aanval.




Na openen is een neusspray beperkt houdbaar.

Schijf daarom bij het eerste gebruik de datum op het flesje.



Als de neusspray niet goed verstuift:

- Controleer of er nog voldoende vloeistof over is.
- Maak de neusspray schoon met water volgens de gebruiksinstructie.
- Spuit in de lucht tot u een mooi gelijkmatige verstuiving ziet.



Werken deze oplossingen niet? Neem dan de neusspray mee naar uw apotheek.

Probeer niet de opening van de neusspray door te prikken.



Apotheek.nl

Betrouwbare informatie van de apotheker

Disclaimer | Deze informatie komt van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

© KNMP 2022



Direct naar Apotheek.nl?
Scan de code!