

# Samenvatting van clonidine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clonidine maakt uw bloedvaten wijder. Het dempt in de hersenen ook de effecten van sommige stoffen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor (bij):

- opvliegers tijdens de overgang
- hoge bloeddruk
- ontweningsklachten bij afkicken van een verslaving
- pijn

Binnen 4 weken zijn de opvliegers minder hevig en komen ze minder vaak voor. Als u stopt met dit medicijn moet het in een paar dagen worden afgebouwd. Uw bloeddruk daalt langzaam binnen een paar weken. Bij ontweningsverschijnselen gebruikt u clonidine een paar dagen tot een week. Het moet daarna in 2 tot 3 dagen worden afgebouwd.

## Gebruik

Clonidine is er als tabletten en injectie. De injectie wordt gebruikt in het ziekenhuis.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met clonidine

- Slik de tablet met een half glas water.
- U gebruikt het medicijn 1 tot 4 keer per dag. Verdeel de doses over de dag. Dan werkt het de hele tijd.

### Injectie met clonidine

U krijgt de injectie in het ziekenhuis van uw arts of verpleegkundige.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig en duizelig worden
- droge mond
- hoofdpijn
- misselijk voelen
- psychische klachten, zoals depressief voelen

De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan clonidine. Houdt u klachten? Of heeft u veel last van deze bijwerkingen?

Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op! Rijd de eerste 3 dagen geen auto.** Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. **Pas nadat u 3 dagen dezelfde dosering heeft gebruikt**, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van bijwerkingen.



**Let op** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Ook kan clonidine de hoeveelheid moedermelk verminderen. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

