

# Samenvatting van levodopa met carbidopa

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Levodopa werkt hetzelfde als dopamine. Dopamine is een lichaamseigen stof. Uw lichaam maakt zelf dus dopamine aan. Dopamine is nodig voor veel hersenfuncties, zoals de aansturing van uw spieren. Carbidopa zorgt dat levodopa langer in uw lichaam werkt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- de ziekte van Parkinson
- rusteloze benen (restless legs)
- stofwisselingsziekten

Bij de ziekte van Parkinson: na een paar dagen tot weken bent u minder stijf en kunt u makkelijker bewegen. Na 3 maanden weet u of het voldoende voor u werkt.

Bij rusteloze benen: het werkt binnen 1 tot 2 uur. Neem het medicijn in voordat u gaat slapen. U weet na 1 of meer nachten of dit medicijn voldoende voor u werkt.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig zijn en misselijk zijn  
Dit gaat meestal binnen een paar weken over, als u gewend bent aan dit medicijn.
- een droge mond
- hartkloppingen
- problemen met bewegen
- plas, zweet en speeksel kunnen een donkere kleur krijgen. Dit is een onschuldig verschijnsel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Gebruik

Levodopa met carbidopa is er als gewone tabletten en tabletten met vertraagde afgifte. Ook is het er als sonde. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met levodopa en carbidopa

Slik de tablet met een half glas water. Doe dit op een lege maag. Dan werken ze het beste.

Lukt innemen op een lege maag niet? Neem dit medicijn dan in met voeding zonder eiwitten, of met weinig eiwitten. Bijvoorbeeld appelmoes, rijst of een boterham met jam.

Neem dit medicijn verdeeld over de dag in. Dan werkt het steeds sterk genoeg.

**Let op!** Gebruikt u de tablet met vertraagde afgifte? Hier komen levodopa en carbidopa langzaam uit vrij. De tabletten niet fijnmaken of kauwen. Anders komt de dosis in één keer vrij. Slik de tablet heel door.

### Sonde met levodopa en carbidopa

Via een vaste sonde (een slangetje in darm of buikwand) krijgt u het medicijn continu in uw lichaam. Uw arts of verpleegkundige zal uitleggen hoe u dit moet gebruiken.

## Waarschuwingen



**Let op\*** Door dit medicijn kunt u slaperig worden, ineens slaapaanvallen krijgen, of in de war raken. U kunt hierdoor minder goed reageren. U mag de **eerste dagen** daarom **niet** autorijden.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op\* Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op\* Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Het kan ervoor zorgen dat de borstvoeding minder wordt. Overleg met uw arts of apotheker.