

Samenvatting van metformine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Metformine maakt uw bloedsuiker lager. Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed. Dit is schadelijk voor uw hart en bloedvaten, zenuwen, ogen en nieren.

Als u minder vruchtbaar bent, zorgt dit medicijn ervoor dat de kans groter is dat een eikel uit uw eierstok vrijkomt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij diabetes mellitus (suikerziekte)
- als u minder vruchtbaar bent geworden door teveel blaasjes (cysten) in uw eierstokken (PCOS)

Bij diabetes zorgt dit medicijn ervoor dat u meestal binnen een paar dagen minder last heeft van dorst, vaak plassen en een droge mond.

Binnen een paar weken bent u minder moe.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Diarree
- Misselijk voelen en overgeven.
Wordt u misselijk? Neem metformine dan bij het eten. Dan heeft u er minder last van.
- Minder zin om te eten
- Vreemde smaak in uw mond, vooral in het begin van de behandeling

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gebruik

Metformine is er als tabletten en tabletten met een vertraagde afgifte.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Gebruikt u de tablet 1 keer per dag?

Neem deze dan **voor u gaat slapen**. Dan werkt het beter.

Let op! De tabletten met **verlengde afgifte** moet u **héél doorslikken**.

Hier komt de werkzame stof langzaam uit vrij. U mag deze tabletten niet **fijnmaken of erop kauwen**. Anders komt de dosis in één keer vrij.

Slik dit medicijn elke dag.

Dan heeft u minder kans op schade door suikerziekte, zoals:

- wonden die slecht genezen
- zenuwpijn
- problemen aan de nieren
- hart- en vaatziekten
- blind worden

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

