

Samenvatting van paroxetine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Paroxetine zorgt voor een betere stemming en het maakt u minder angstig. Het zorgt er ook voor dat een man minder snel klaarkomt tijdens het vrijen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- depressie
- angststoornissen. Zoals dwangstoornis, paniekstoornis en sociale fobie en angst na traumatische gebeurtenissen (posttraumatische stressstoornis).
- zenuwpijn
- jeuk
- premenstrueel syndroom fDA G₂
- te snel klaarkomen (vroegtijdige zaadlozing)
- opvliegers tijdens de overgang

U merkt binnen een paar dagen dat uw klachten minder worden. Meestal duurt het een paar weken voordat dit medicijn het best werkt.

Gebruik

Paroxetine is er als tabletten en als drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met paroxetine

Slik de tabletten met een half glas water.

Drank met paroxetine

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker.
3. Drink die hoeveelheid op.

Gebruik

U kunt last krijgen van:

- uw maag en darmen
- problemen met seks. Bijvoorbeeld moeilijker een erectie of orgasme krijgen.
- suf of slaperig zijn
- niet kunnen slapen
- onrustig zijn
- moeilijker kunnen concentreren

Stop niet met dit medicijn als u deze bijwerkingen heeft. Ze worden meestal binnen 2 week minder.

Heeft u last van suf of slaperig zijn? Slik dit medicijn dan voordat u gaat slapen.

Heeft u last van onrustig zijn of kunt u niet slapen? Slik dit medicijn dan in de ochtend.

Blijft u last houden van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Paroxetine en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met paroxetine.



Let op! Rijd geen auto zolang u suf en slaperig bent of als u zich niet goed kunt concentreren.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer en slaperiger maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

