

Samenvatting van pramipexol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Pramipexol werkt hetzelfde als dopamine. Dopamine is een lichaamseigen stof. Uw lichaam maakt zelf dus dopamine aan.

Dopamine is nodig voor veel hersenfuncties, zoals de aansturing van uw spieren.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- de ziekte van Parkinson
- rusteloze benen (restless legs)

Bij de ziekte van Parkinson: na een paar dagen tot weken bent u minder stijf en kunt u makkelijker bewegen.

Bij rusteloze benen: het werkt binnen 1 tot 3 uur.

Na 3 maanden weet u of het voldoende voor u werkt.

Gebruik

Pramipexol is er als gewone tabletten en tabletten met vertraagde afgifte.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Neem de tabletten in op een lege maag, dan werken ze het best.

Lukt innemen op een lege maag niet? Neem dit medicijn dan in met eten dat geen of weinig eiwitten bevat.

Als u het gebruikt bij rusteloze benen, neem het medicijn dan in 2 tot 3 uur voordat u gaat slapen.

Let op! De tabletten met **verlengde afgifte** moet u héél doorslikken. Hier komt de werkzame stof langzaam uit vrij. U mag deze tabletten **niet fijnmaken of erop kauwen**. Anders komt de dosis in één keer vrij.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig zijn of misselijk zijn.
Dit gaat meestal binnen een paar weken over, als u gewend bent aan dit medicijn.
- een droge mond
- hartkloppingen
- problemen met bewegen
- in de war zijn
- slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



Let op! Door dit medicijn kunt u slaperig worden, ineens slaapaanvallen krijgen, of in de war raken. U kunt hierdoor minder goed reageren. U mag daarom de eerste dagen, of wanneer de dosering omhoog gaat, niet autorijden.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. En of dit medicijn veilig is voor de baby. Het kan ervoor zorgen dat de borstvoeding minder wordt. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

