

# Samenvatting van buprenorfine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Buprenorfine is een **sterke pijnstiller** (opiat).

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- pijn
- verslaving aan opiaten
- pijn en jeuk bij mensen die niet meer beter worden

Tabletten onder de tong werken binnen een half uur tot een uur. Bij pijn en jeuk blijft buprenorfine ongeveer 6 tot 8 uur werken.

Pleisters werken na 1 tot 3 dagen. Daarna blijft de pleister een paar dagen tot 1 week werken.

## Gebruik

Buprenorfine is er als tablet voor onder de tong en als pleister. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als injecties. Deze tekst gaat alleen over de tablet voor onder de tong en de pleister. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gebruik buprenorfine volgens een **vast schema**. U krijgt het schema van uw arts of apotheker.

### Tabletten voor onder de tong met buprenorfine

1. Plaats de tablet onder uw tong en wacht tot de tablet helemaal is opgelost.
2. **Let op!** Niet zuigen of bijten op de tablet. Slik het ook niet door.

### Pleister met buprenorfine

1. Plak de pleister op een schone en droge plaats.
2. **Let op!** Plak de pleister elke keer op een **andere plaats**.
3. De plaats met de pleister mag niet boven de 40 graden Celsius komen. Dan kan het medicijn te snel vrijkomen. U heeft dan meer kans op bijwerkingen. met uw apotheker of arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- erge verstopping.  
Gebruik daarom elke dag een laxeremiddel.
- suf of duizelig zijn
- maagklachten en darmklachten, zoals misselijk zijn en overgeven

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



Heeft u buprenorfine lang gebruikt en wilt u stoppen? **Stop niet in één keer**. Anders kunt u last krijgen van klachten. Vraag uw apotheker of arts om advies.



**Let op!** U mag niet altijd autorijden als u dit medicijn gebruikt. Dit komt doordat u suf en duizelig kan zijn. Hoe lang u niet mag autorijden hangt af van hoe u dit medicijn gebruikt. Overleg hierover met uw apotheker of arts.



**Let op met alcohol** als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Gebruik dit medicijn **niet** vlak voor de bevalling.



**Let op!** U mag dit medicijn een korte tijd gebruiken als u borstvoeding geeft. Bijvoorbeeld een paar dagen. Moet u dit medicijn langer gebruiken? Overleg dan met uw apotheker of arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan bijwerkingen geven bij de baby.