

Samenvatting van Estradiol met dydrogesteron

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Estradiol is een oestrogeenhormoon en dydrogesteron een progestageenhormoon. Deze hormonen spelen een belangrijke rol bij de vruchtbaarheidscyclus. Dydrogesteron zorgt ervoor dat estradiol geen bijwerking geeft op de baarmoeder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij klachten van de overgang, zoals opvliegers. Binnen een paar weken worden de klachten van de overgang minder.

Vroeger werd het ook gebruikt bij botontkalking.

Gebruik

Estradiol met dydrogesteron is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een heel glas water.

U mag de tabletten met of zonder eten slikken.

U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

- Femoston: houd precies de volgorde van innemen aan van de kalenderverpakking. U kunt meteen beginnen, u hoeft dus niet te wachten tot u een menstruatie krijgt. U slikt deze tablet continu door, zonder stopdagen. Na het innemen van de laatste tablet met het progestageenhormoon zal na enkele dagen een op een menstruatie lijkende onttrekkingsbloeding ontstaan. Deze is vergelijkbaar met de bloeding in de stopweek van de anticonceptiepil.
- Femoston continu: het maakt niet uit wanneer u begint. U slikt deze tablet continu door, zonder stopdagen. In de eerste maanden kunnen doorbraakbloedingen ontstaan. Deze verdwijnen vanzelf. Blijf gewoon doorgaan met het innemen van de tabletten.

Gebruik dit medicijn liever niet langer dan 5 jaar.

De kans op ernstige bijwerkingen als borstkanker is namelijk groter als u dit medicijn langer gebruikt. De kans op deze bijwerkingen blijft wel klein.

Bijwerkingen

In het begin kunt u last krijgen van:

- misselijk voelen
- hoofdpijn
- pijnlijke borsten
- doorbraakbloedingen
- afscheiding uit uw vagina

Blijft u last houden? Ga dan naar uw arts.

Andere bijwerkingen zijn:

- dikke enkels en voeten
- zwaarder worden
- buikpijn, diarree, een opgeblazen gevoel
- minder zin in vrijen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Dit medicijn wordt meestal alleen gebruikt door vrouwen die niet meer zwanger kunnen worden, dus geen borstvoeding geven. Geeft u toch borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk terecht. Maar de hoeveelheid is klein en schadelijke effecten voor de baby zijn er waarschijnlijk niet. Een groter probleem is dat het oestrogeenhormoon de borstvoeding laat teruglopen. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

